PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DAS DOENÇAS MITOCONDRIAIS: UMA ANÁLISE DA REDE NACIONAL DE DOENÇAS RARAS

Monique Sartori Broch^{1,3}, Gabriella Zanin Figuera^{1,3}, Laíse Pauletti Barp^{1,3}, Pâmela Rossato^{1,3}, Angélica Piovesana^{1,2,3}, Claudia Fernandes Lorea^{1,3}, Isadora Viegas^{1,3}, Angelina Acosta^{3,4}, Carlos Eduardo Steiner^{3,5}, Antonette Souto El Husny^{3,6}, Luiz Carlos Santana da Silva^{3,6}, Mara Lucia Schmitz Ferreira Santos^{3,7}, Bibiana Mello de Oliveira^{1,3}, Têmis Maria Félix^{1,2,3}, Raras Network Group.

¹Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA); ²Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); ³Rede Nacional de Doenças Raras; ⁴Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES); ⁵UNICAMP; ⁶Hospital Bettina Ferro de Souza; ⁷Hospital Pequeno Príncipe.

INTRODUÇÃO:

As doenças mitocondriais são distúrbios genéticos que afetam o funcionamento das mitocôndrias, podendo comprometer a produção de energia celular.

Entre as formas mais prevalentes destacam-se a síndrome MELAS, a neuropatia óptica hereditária de Leber (LHON) e a síndrome de Leigh.

As manifestações incluem atraso no desenvolvimento, perda de audição e/ou visão, fraqueza muscular, problemas gastrointestinais, enxaqueca e convulsões (Figura 1).

Figura 1. Caráter multisistêmico das doenças mitocondriais.

OBJETIVO:

Analisar o perfil clínico-epidemiológico de indivíduos com diagnóstico confirmado ou suspeito de doenças mitocondriais, registrados no inquérito epidemiológico da Rede Nacional de Doenças Raras (RARAS).

METODOLOGIA:

Foram utilizados dados das etapas retrospectiva (2018-2019) e prospectiva (2022 a fevereiro 2025) do inquérito epidemiológico da RARAS, coletados por meio de um formulário padrão utilizando a plataforma REDCap.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Do total de 18.416 registros, foram identificados 81 (0,4%) casos de doenças mitocondriais, sendo 44 (54,3%) do sexo masculino e 39 (48,1%) da cor branca (Tabela 1).

No momento da entrevista, a média de idade foi de 20 anos (± 16). A média de idade do início dos sintomas foi de 6,8 anos ($\pm 7,8$). Em relação à origem, 30,8% dos pacientes nasceram na região sudeste, 25,9% no nordeste e 18,5% na região sul (Figura 2).

Do total de casos, 60% apresentavam diagnóstico confirmado de doença mitocondrial, com tempo médio de 6,3 ($\pm 7,8$) anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico definitivo. Até o momento do diagnóstico, os pacientes passaram, em média, por três serviços de saúde e consultaram aproximadamente 3,8 médicos diferentes.

A maioria dos diagnósticos foi etiológico (78,8%), sendo quase a totalidade molecular (86,4%). Dentre os casos confirmados, neuropatia óptica hereditária de Leber foi o diagnóstico mais frequente (16%, Tabela 1).

Em relação à recorrência familiar, 33,3% dos pacientes relataram histórico de doenças mitocondriais na família.

Tabela 1. Caracterização da amostra (n = 81).

Região de nascimento	N (%)
Sudeste	25 (30,8%)
Nordeste	21 (25,9%)
Sul	15 (18,5%)
Gênero	N (%)
Masculino	44 (54,3%)
Feminino	37 (45,7%)
Diagnósticos mais frequentes	N (%)
Neuropatia óptica hereditária de Leber	8 (16%)
Síndrome MELAS	5 (10,2%)
Síndrome de depleção do DNA mitocondrial (forma encefalomiopática)	4 (8%)
Síndrome de Kearns-Sayre	3 (6%)
Miopatia mitocondrial com oftalmoplegia externa progressiva e crônica com início na idade adulta	3 (6%)
Manifestações mais frequentes	N (%)
Convulsões	12 (14,8%)
Ataxia	11 (13,5%)
Hipotonia	9 (11,1%)

Figura 2. Município de nascimento dos participantes (n = 81)

Além disso, houve registro de consanguinidade parental em 16% dos casos.

Em 30% dos indivíduos houve relato de internação hospitalar progressiva.

CONCLUSÃO:

Este estudo destaca a importância de um reconhecimento precoce dos sinais e sintomas relacionados ao metabolismo energético.

A identificação de quadros compatíveis deve acentuar a suspeita de doenças mitocondriais, permitindo intervenções precisas.

Ademais, ressalta-se a importância do aconselhamento genético e do acompanhamento multidisciplinar na formulação de estratégias terapêuticas, importantes na manutenção da independência e da autonomia desses indivíduos.

REFERÊNCIAS:

Félix, T.M., et al. Epidemiology of rare diseases in Brazil: protocol of the Brazilian Rare Diseases Network (RARAS-BRDN). Orphanet J Rare Dis 17, 84 (2022).

Agradecimentos:

Pesquisadores da Rede Nacional de Doenças Raras; Ministério da Saúde/SCTIE/DECIT e CNPq.